

胃カメラ検査を受けられる患者様へ

インシュウ 科ウシヤセン

練習 放射線 1

様

検査は 時 分からです。

検査時間の10分前までに、受付を済ませてください。

検査は（ ☐ 鼻 ☐ 口 ）からの予定です。

- ※ 前日の夕食は、夜7時までに済ませてください。
- ※ 当日の朝は、何も食べずにおこし下さい。
- ※ 当日の水分は、水かお茶のみ、検査の約2時間前（ : ）
まで、飲んでかまいません。
- ※ 当日朝、6時に朝の血圧の薬【 】を
内服してください。
- ※ 当日朝、糖尿病の薬【 】の内服、
インスリン注射【 】は
使用しないでください。
- ※ 当日、血液検査をする場合があります。

血液サラサラの薬を内服中の方

検査の前、 月 日 ~ 月 日までの間、
【 】の内服を休止してください。

何か不明なことや、予定の変更などがありましたらご連絡ください。

岩国市立錦中央医院 0827-72-2321

患者ID: 9999900071

患者氏名: 練習 放射線 1

説明書および同意書 (下部消化管内視鏡検査)

< 検査の目的と方法 >

貧血や下血の原因を調べたり、炎症性腸疾患・ポリープ・癌などを診断するために、肛門から内視鏡（直径約12mm）を挿入して大腸の粘膜を観察します。その際、必要であれば組織検査（生検）やポリープ切除術を行います。また、出血している病変があった場合は止血などの処置を行うこともあります。

< 検査に伴う副作用・偶発症 >

薬剤による副作用：局所麻酔や鎮静剤によるショック症状（血圧低下）など

検査による偶発症：内視鏡操作や生検・ポリープ切除による出血や穿孔（消化管に穴があくこと）など
日本消化器内視鏡学会の調査では、偶発症の発生頻度は0.04%（約2500人に1人）、死亡率は0.0005%（約20万人に1人）と報告されています。偶発症のうち問題となるのは大腸穿孔で、ほとんどの場合は大腸の癒着や大腸壁に脆弱部分が存在するなどの背景があって発生します。もし穿孔を生じた場合は入院や手術治療が必要になることがあります。また、これらの偶発症の早期発見・治療のため、検査後に数日間の入院をお願いすることもあります。

下部消化管内視鏡検査を行うにあたって、以下の薬剤を使用します。

☐ キシロカイン（肛門部の局所麻酔薬）

キシロカインによるアレルギー歴（ ☐ あり ☐ なし ）

☐ ブスコパン（消化管運動を抑える薬）

前立腺肥大（ ☐ あり ☐ なし ）、 緑内障（ ☐ あり ☐ なし ）、
心筋梗塞や狭心症の既往（ ☐ あり ☐ なし ）

☐ グルカゴン（消化管運動を抑える薬）

糖尿病（ ☐ あり ☐ なし ）

令和07年10月17日(金)

説明医師

同意書

私は下部消化管内視鏡検査を受けるにあたり、検査の目的や方法、副作用、偶発症について十分理解しましたので、その実施について同意いたします。また検査中に緊急または予想外の処置をする必要性が生じた場合に、適宜処置されることについても同意いたします。

____ 年 ____ 月 ____ 日

患者氏名

代理人名

（続柄）

下部消化管内視鏡検査報告書

ID 9999900071		検査日	
フリガナ レンジュ ネウシャセン1		区分 ☐ 外来 ☐ 入院	
患者氏名 練習 放射線1		診療科	
性別 男	年齢 74	検査医 マスタ管理者（放射線）	
臨床診断 【カルテより病名取得が可能】			
検査目的 【定型文の選択が可能】			
診断 【定型文の選択が可能】			
所見 【定型文の選択が可能】			
コメント 【定型文の選択が可能】			
生検 ☐ あり ☐ なし		使用内視鏡 ☐ 経口 ☐ 経鼻 ☐ 右 ☐ 左	
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	
Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6	

消化管検査問診票

令和07年10月17日(金)

消化管検査をお受けになる方は、次の問いの該当する箇所に○印をつけてください。

ID: 9999900071 氏名: レントゲン 納サセン1 練習 放射線1

年齢: 74歳

- 1) 消化管検査を受けたことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 2) 緑内障と言われたことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 3) 高血圧症と言われたことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 4) 狭心症、心筋梗塞等と言われたことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 5) 脳梗塞と言われたことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 6) 喘息と言われたことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 7) 糖尿病と言われたことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 8) 薬や注射で気分が悪くなったことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 9) 血液をさらさらにする薬を飲んでいますか。 (はい ・ いいえ)
- ☐ バファリン ☐ プレタール ☐ ワーファリン ☐ パナルジン
- ☐ プラビックス ☐ その他 ()
- 10) 男性の方: 前立腺肥大と言われたことがありますか。 (はい ・ いいえ)
- 11) 女性の方: 妊娠していますか。 (はい ・ いいえ)
- 12) 体内に以下のものが入っていますか。 (はい ・ いいえ)
- ☐ 心臓ペースメーカー ☐ 金属片 (人工骨頭・人工関節) 部位
- 13) その他、症状や気になることがありますか。
- ()

患者ID: 9999900071

患者氏名: 練習 放射線 1

説明書および同意書 (上部消化管内視鏡検査 □ 経口 □ 経鼻)

< 検査の目的と方法 >

腹痛や貧血の原因を調べたり、潰瘍・ポリープ・癌・ヘリコバクターピロリ菌の有無などを診断するために、口や鼻から食道・胃・十二指腸に内視鏡を入れて観察します。その際、必要であれば病変の一部を採取して、組織検査（生検）を行います。また、出血している病変があった場合は止血などの処置を行うこともあります。

< 検査に伴う副作用・偶発症 >

薬剤による副作用：のどや鼻の局所麻酔によるショック症状（血圧低下）など

検査による偶発症：内視鏡操作や組織採取による出血や穿孔（消化管に傷がついたり穴があくこと）など

日本消化器内視鏡学会の調査では、偶発症の発生頻度は0.012%（約1万人に1人）、死亡率は0.00076%（約13万人に1人）と報告されています。副作用や偶発症が発生した場合には最善の処置・治療を行います。

上部消化管内視鏡検査を行うにあたって、以下の薬剤を使用します。

☐ キシロカイン（のどや鼻の局所麻酔薬）

☒ キシロカインによるアレルギー歴（ ☐ あり ☐ なし ）

☐ プリピナ（経鼻内視鏡検査における鼻出血予防薬）

☐ ブスコパン（消化管運動を抑える薬）

前立腺肥大（ ☐ あり ☐ なし ）、 緑内障（ ☐ あり ☐ なし ）、

心筋梗塞や狭心症の既往（ ☐ あり ☐ なし ）

☐ グルカゴン（消化管運動を抑える薬）

糖尿病（ ☐ あり ☐ なし ）

☐ ミンクリア（消化管運動を抑える薬）

令和07年10月17日(金)

説明医師

同意書

私は上部消化管内視鏡検査を受けるにあたり、検査の目的や方法、副作用、偶発症について十分理解しましたので、その実施について同意いたします。また検査中に緊急または予想外の処置をする必要性が生じた場合に、適宜処置されることについても同意いたします。

____ 年 ____ 月 ____ 日

患者氏名

代理人名

（続柄）

上部消化管内視鏡検査報告書

ID 9999900071		検査日	
フリガナ リンシュウ ホウシャセン1		区分 ☐ 外来 ☐ 入院	
患者氏名 練習 放射線1		診療科	
性別 男	年齢 74	検査医 マスタ管理者 (放射線)	
臨床診断 【カルテより病名取得が可能】			
検査目的			
診断			
所見			
コメント			
生検 ☐ あり ☐ なし		使用内視鏡 ☐ 経口 ☐ 経鼻 ☐ 右 ☐ 左	
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	
Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6	

大腸カメラ検査を受けられる患者様へ

レシユウ ネウシヤセン

練習 放射線 1 様

検査は _____ 午後 です。

当日は、8時15分に受付へお越しください。

— 前日 (_____) _____

- ※ 朝食から夕食まで消化の良いものを食べてください。
(食事の内容は、2枚目をご参照ください。)
- ※ 寝る前に、下剤(ラキソベロン1本)をコップの1杯のお水に混ぜて内服してください。

血液サラサラの薬を内服中の方

検査の前、 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 月 _____ 日までの間、
【 _____ 】の内服を休止してください。

— 当日 (_____) _____

- ※ 朝は何も食べずにお越しください。
- ※ 朝、6時に朝の薬のみ内服してください。
- ※ 朝から来院まで、水分(水かお茶のみ)をしっかりとってください。
- ※ 朝、糖尿病の薬【 _____ 】の内服、
インスリン注射【 _____ 】は使用しないでください。
- ※ 検査内容によっては入院となる可能性があります。
1泊程度の入院準備をしてきてください。
- ※ 病院到着後、血液検査、尿検査、胸部X線検査、心電図検査を行う予定です。
(※前もって検査を済まされた方は、当日はありません)

検査前日は、朝食から夕食まで消化の良いものを食べましょう。
内容は以下を参照してください。

食べてもよいもの ○	食べない方がよいもの ×
・ ごはん ・ おかゆ ・ 食パン ・ うどん ・ 味噌汁 (ワカメ、油揚げは×) ・ たまご (生たまごは×) ・ とうふ ・ 繊維の少ない野菜の煮物	・ 食物繊維が多いもの (ごぼう、たけのこ、白菜、きのこ、こんにゃく) ・ 発酵しやすいもの (いも、まめ類、納豆、おから) ・ 脂肪の多いもの (あぶらの多い肉・魚、乳製品) ・ 刺激の強いもの (わさび、とうがらし、カレー) ・ 消化に時間のかかるもの (もち、そば、すし)

何か不明なことや、予定の変更などがありましたらご連絡ください。